

JESENÍK 2004 – ADIKTOLOGICKÁ PROBLEMATIKA

Tohto roku sa nekonal samostatný blok prednášok, len v bloku voľných príspevkov boli dve prednášky z tohto problémového okruhu.

V prvej Višňovský a Kavalířová (HK) sledovali inhalačný konzum návykových látok u 1832 študentov vysokých škôl. Pravidelne fajčilo nikotín 26,3 % študentov, marihuanu 10,3 %. Rozpúšťadlá inhalovalo len 0,8 % študentov. Miovský a kol. (Olomouc) venovali pozornosť konzumu konope v ČR. Citovali štúdiu z Prahy. 10,9 % dospeljej populácie fajčilo konope. V štúdiu ESPAD 46,2 % učňov a stredoškolských študentov užilo konope. Autori odhadli celoživotnú prevalenciu užívania konopnej drogy v ČR na 1,5 milióna obyvateľov.

Niekoľko adiktologických príspevkov bolo na výveskách.

Bečka a Popov uviedli, že v ČR podáva metadón 8 centier (sic!) v rámci substituenej terapie. Celkove ide o 367 pacientov. Na metadóne bolo stíhaných len 2,6 % závislých, z kontrolných pacientov až 61 %!

Bodnár z košickej kliniky informoval o súbore vysokoškolských vzdelaných (n = 147) pacientov liečených na košickej klinike pre závislosť. Prekvapivo prevažovali ženy, len 4 pacienti súhlasili s dlhodobou PAL.

Chval prezentoval kazuistiky pacientov, u ktorých liečil delírium tremens fenytoinom. Pochvaloval si antiepileptický účinok. Janatka a Morávek (Praha) zistili, že 70 % schizofrenikov fajčí, čo je podstatne viac než vo všeobecnej populácii.

Kavalířová a Višňovský (HK) na posteru zo známeho súboru prezentovali prevalenciu konzumu heroínu na troch vysokých školách. Len 0,55 % študentov malo skúsenosti s heroínom.

Pekárková a kol. (PL Bohnice) skúsili liečiť alkoholizmus naltrexonom. Podávali ho 6 týždňov 45 pacientom v dávke 50 mg denne. Kontrolu tvorilo 32 pacientov liečených štandardne. Na naltrexone 42 zo 45 pacientov dokončilo liečbu, z kontrol len 25 z 32. Pacienti na naltrexone mali menej intenzívny craving meraný vizuálnou analógovou škálou.

Martinove (Predná Hora) prezentovala skúsenosti s liečbou depresie u závislých. Najčastejšie používala tianeptín.

Pokora (Brno) prezentoval dve kazuistiky s mirtazapínom (Remeron) u pacientov s alkoholovou depresiou. O oboch pacientov bol mirtazapín efektívny.

Prezentovali sa aj predklinické sledovania skupiny prof. Šulcovej z Brna s kanabinoidnými receptormi a metamfetamínom. Ide o veľmi zaujímavé pokusy, ktoré by si vyžadovali čítanie in extenso.

Celkove možno povedať, že na tohtoročných „Jeseníkoch“ adiktologická problematika nebola v centre pozornosti.

Doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.