



Dopyt po liečbe kvôli problémom s halucinogénmi na Slovensku

Kamendy, Z., Okruhlica, Ľ.

Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava

Dni prof. Vladimíra Novotného v Bojniciach (11.Bojnická AT konferencia)

11. - 13. 10. 2019, Bojnice



Autori práce týmto prehlasujú, že nemajú žiaden konflikt záujmov.

Úvod

halucinogény

skresľujú vnemy - seba, sveta, času, halucinácie,
výrazne menia náladu - eufória, úzkosť, panika.

„**LSD**“ (dietylamid kyseliny lysergovej)

psilocybín (hlohovec) „extáza“ (MDMA), fencyklidín (PCP), ketamín

Cieľ


Cieľom práce bolo z jedného aspektu analyzovať nám dostupné údaje o užívaní halucinogénov na Slovensku a poskytnúť ich našej odbornej verejnosti.

Metódy

Slovenské dáta


- ESPAD
- NMCD
- NCZI
- IDZ CPLDZ

Výsledky: frekvencia výskytu užitia nelegálnej drogy u mládeže v roku 2015 (%)




(zdroj: ESPAD)

Výsledky: liečení uživatelů drog na Slovensku




Výsledky: Liečenie užívateľia drog na Slovensku podľa primárnej drogy – halucinogény (1996 – 2018)



Zdroj: NCZI

Výsledky: prvé žiadosti o liečbu CPLDZ Bratislava



Výsledky:

Na Slovensku v r. 2018

3 038

liečených užívateľov drog

z toho

4 kvôli halucinogénom

0,13 %

Zdroj: NCZI

Výsledky:

v CPLDZ Bratislava

za 20 rokov **4 868** prvoliečených

z toho **3 (!)** kvôli halucinógenom

0,06 %

skúsilo 20 - 30 %

Zdroj: IDZ CPLDZ

Riziká halucinogénov

- užívanie je nebezpečné, nepoznáme koncentráciu ani o čo ide;
- vyvoláva intoxikačnú psychózu;
- môže vyvolať vážnu duševnú poruchu, riziko sebapoškodenia;
- užívateľ sa dostáva do kontaktu s kriminálnym prostredím, kde sú dostupné i iné nebezpečné drogy.

Výskumy

(predbežné, čiastkové)

Skúmané sú možné pozitívne účinky pri liečbe:

-depresií, -úzkosti, -alkoholizmu, -nikotinizmu, - posttraumatickej stresovej poruchy

Výskumy

(problémy)

- málo kvalitných štúdií
- metodologicky náročné
- finančne náročné (nový liek - cca **3 mld. USD**)
- neznáme: bezpečné dávky,
ako dlho podávať,
ako vybrať vhodných pacientov,
aké sú možné dlhodobé negatívne následky,
aké je riziko zdravotných komplikácií.

Záver

- Minimálny alebo žiadny adiktívny potenciál
- ? výskyt možných závažných intoxikácií, ktoré sa dostávajú na urgentné príjmy v rámci toxických psychóz

Odporúčanie – skríning pri akútnych psychózach

Ďakujeme za pozornosť 😊

kamendy@cpldz.sk